

Las enfermeras que trabajan en quirófanos tienen un mayor riesgo de asma persistente grave

Un nuevo estudio sugiere que las enfermeras que trabajan en quirófanos tienen un mayor riesgo de asma persistente grave, probablemente a causa de la inhalación de agentes químicos procedentes de los desinfectantes de limpieza. Los resultados se publican en el *Journal of Occupational and Environmental Medicine*.

CREAL

18/9/2013 13:15 CEST



Quirófano. / <http://www.sxc.hu/>

Científicos del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) han analizado el riesgo de asma persistente grave en las enfermeras.

Los expertos concluyen que las enfermeras que trabajan en quirófanos tienen un mayor riesgo de asma persistente grave, probablemente a causa de la inhalación de agentes químicos procedentes de los desinfectantes de limpieza.

"Este trabajo es un paso importante hacia la prevención del asma relacionada con el trabajo de profesionales de la salud", explica Jan-Paul Zock, uno de los autores del trabajo publicado en el *Journal of Occupational and Environmental Medicine*.

De hecho, según el estudio las enfermeras 'de quirófano' tienen más riesgo

de padecer accidentes de trabajo, estrés, así como una alta exposición a agentes tóxicos, incluyendo agentes infecciosos, radiaciones, ruido, guantes de látex y gases anestésicos.

Productos relacionados con el asma

Los resultados revelan que los desinfectantes y productos de limpieza contribuyen a la prevalencia del asma en los trabajadores de la salud, especialmente para las enfermeras. Además, algunos productos de limpieza utilizados por las trabajadoras del hospital se han asociado igualmente con esta dolencia.

Los desinfectantes y productos de limpieza
contribuyen a la prevalencia del asma en los
trabajadores de la salud

Asimismo, en las enfermeras se han identificado un mayor riesgo de asma ocupacional, asma del adulto, y la exacerbación del asma. En estos estudios, las enfermeras eran a menudo comparadas con los grupos de trabajadores con estatus socioeconómico potencialmente heterogéneo.

Hasta ahora ningún artículo había evaluado la asociación entre trabajar como enfermera de quirófanos, un alto riesgo de exposición a desinfectantes de limpieza y el asma.

Referencia bibliográfica: Le Moual N, Varraso R, Zock JP, Henneberger P, Speizer FE, Kauffmann F, Camargo CA Jr. "Are operating room nurses at higher risk of severe persistent asthma? The Nurses's Health Study". *J Occup Environ Med* 2013; 55(8): 973-7.

Derechos: **Creative Commons**

EXPOSICIÓN | AGENTES | TÓXICOS | ASMA | PERSISTENTE |

Creative Commons 4.0

Puedes copiar, difundir y transformar los contenidos de SINC. [Lee las condiciones de nuestra licencia](#)