

Qué aconseja la EMA a las personas vacunadas con AstraZeneca

Aunque los casos de trombosis se consideran muy poco frecuentes, la Agencia Europea del Medicamento ha advertido a los pacientes inmunizados con el suero de Oxford/AstraZeneca que vigilen su estado de salud durante las dos semanas posteriores a la inoculación para poder identificar los raros, pero posibles síntomas.

SINC

7/4/2021 18:14 CEST



Vacuna de AstraZeneca. / EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

El suero de **Oxford/AstraZeneca**, ahora llamado Vaxzevria, es una de las cuatro vacunas autorizadas en la Unión Europea para proteger contra la **COVID-19**. Hasta el momento, los estudios han demostrado que es eficaz para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de hospitalización y muerte, si bien se han producido casos de **dos tipos de trombosis con plaquetas bajas** en personas inmunizadas.

Como consecuencia, la Agencia Europea del Medicamento ([EMA](#), por sus siglas en inglés) ha subrayado la [importancia de un tratamiento médico especializado rápido](#) ante la aparición de varios síntomas en las dos semanas siguientes a la vacunación.

Las personas vacunadas deben buscar asistencia médica si presentan los siguientes síntomas: dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna y pequeñas manchas de sangre bajo la piel

“La probabilidad de que esto ocurra es muy baja, pero aun así se debe estar atento a los síntomas para poder recibir un tratamiento médico urgente que ayude a la recuperación y evite complicaciones”, han asegurado desde el comité de farmacovigilancia de la EMA ([PRAC](#)).

“Si se reconocen los signos de coágulos de sangre y de disminución de las plaquetas y se tratan a tiempo, los profesionales sanitarios pueden ayudar a los afectados en su recuperación y evitar complicaciones”, han declarado.

Así, las personas vacunadas deben buscar asistencia médica inmediatamente si presentan los siguientes síntomas: **dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos** (como dolores de cabeza intensos y persistentes o visión borrosa) **y pequeñas manchas de sangre bajo la piel** más allá del lugar de la inyección.

“Es de gran importancia que los profesionales de la salud y las personas que acuden a vacunarse sean conscientes de estos riesgos y estén atentos a los posibles signos o síntomas que suelen aparecer en las dos primeras semanas tras la vacunación”, ha afirmado **Sabine Straus**, presidenta del PRAC.

Además, la EMA ha aconsejado consultar con profesionales sanitarios o ponerse en contacto con las autoridades correspondientes ante cualquier duda sobre la implantación de la vacuna en su país.

Derechos: **Creative Commons**.

TAGS

COVID-19

VACUNAS

ASTRAZENECA

TROMBOSIS

VACUNACOID

Creative Commons 4.0

Puedes copiar, difundir y transformar los contenidos de SINC. [Lee las condiciones de nuestra licencia](#)